

Racumin polvo

Formulación única para el control de roedores

Ficha Técnica



Racumin®

Polvo

Formulación única para el control de roedores

Rodenticida



En madrigueras
Espolvorear 100 - 200 g
de Racumin® polvo



En interiores o exteriores
Espolvorear el 5% del
peso total del cebo



Ejemplos de cebo a base
de Racumin® polvo

Cantidad	Cebo a utilizar
500 g	Harina de maíz amarillo
250 g	Avena machacada
50 g	Azúcar
50 g	Acetate de maíz
50 g	RACUMIN® polvo
500 g	Maíz amarillo
400 g	Harina de trigo
50 g	Azúcar
50 g	RACUMIN® polvo
900 g	Alimento para aves
50 g	Azúcar
50 g	RACUMIN® polvo

Características y Beneficios:

- La muerte se produce de 3 a 6 días después de la ingestión del producto.
- No tiene olor ni sabor, por estas propiedades y su concentración es ideal para la elaboración de cebos y para utilizar en sitios donde se requiere de preparaciones especiales o variar la composición del cebo utilizado, para aumentar su aceptación y efectividad.
- La coagulación sanguínea deja de funcionar normalmente, lo que produce hemorragias internas produciendo la muerte.

Presentación: Sobre x 50 g - Frasco x Kg

Racumin® Polvo Reg. Sanitario: RGSP-253-2005
Reg. INVIMA 2007V-0004312

Racumin polvo

Formulación única para el control de roedores

Ficha Técnica



Racumin® Polvo

Única formulación en
el control de roedores

- **Racumin® polvo** actúa como anticoagulante de la sangre y produce hemorragias internas progresivas hasta causar la muerte a ratas y ratones. La muerte se produce de 3 a 6 días después de la ingestión del producto.

Beneficios:

- Excelente control de roedores por la alta concentración de su ingrediente activo.
- Buena flexibilidad en el uso por su formulación en polvo.
- Ingestión garantizada por el hábito del roedor de lamerse constantemente.
- La aplicación no genera rechazo a los roedores por no tener olor ni sabor en su formulación.

Preparación de cebos:

Para preparar cebos se puede emplear **Racumin® polvo** que se mezclará con productos que consumen los roedores en la proporción de 1:19. Es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones en la preparación de los cebos:

1. Buen estado de la materia prima.
2. Triturar muy bien los granos o cereales.
3. Usar equipos para el mezclado sin olores ni contaminación.
4. Usar guantes durante la preparación.
5. Usar el cebo recién preparado, no almacenar.

A continuación tres ejemplos de cebo a base de **Racumin® polvo**.

Cantidad	Cebo a utilizar
600 g	Harina de maíz amarillo
280 g	Avena machacada
50 g	Azúcar
50 g	Aceite de maíz
50 g	RACUMIN® polvo
500 g	Maíz amarillo
400 g	Harina de trigo
50 g	Azúcar
50 g	RACUMIN® polvo
900 g	Alimento para aves
60 g	Azúcar
60 g	RACUMIN® polvo

10

Sitios de aplicación	Producto	Dosificación
Madrigueras	RACUMIN® polvo	Espolvorear 100 - 200 g
Interiores y/o exteriores	RACUMIN® polvo	5% del peso total del cebo a espolvorear
	RACUMIN® pasta	2-3 bolsitas/ 10 g por cebadero

Antídoto:

En caso de intoxicaciones, llame o lleve el paciente al médico y muéstrele copia de la etiqueta.

Tratamiento vitamina K1

Precauciones:

- Evitar que el **Racumin® polvo** sea ingerido por personas o animales domésticos.
- No aplicar sobre forrajes o alimentos.
- Después de manipular el producto, lavarse bien las manos con agua y jabón.

Aplicación:

El **Racumin® polvo** se puede esparcir sobre superficies que frecuentan los roedores como entrada a las guaridas, sendas de tránsito, o aplicado con una máquina de espolvoreo directamente a la madriguera. El polvo se adhiere a las patas y cuerpo del animal, lo que asegura la intoxicación por vía digestiva, debido a que el roedor tiene la costumbre de lamerse. La capa de **Racumin® polvo** debe revisarse y renovarse en caso necesario.



Presentaciones:

Tarro x 1 kg
Sobre x 50 g

Racumin® Polvo
Reg. Sanitario: RGSP-253-2008
Reg. INVIMA: 2007V-0004312